

# COVID-19の種類とブースター接種 ファクトシート

## COVID-19ブースター接種：

### ワクチンの追加接種が必要な理由とは？



#### COVID-19ブースターを接種し続けなければならない理由は何ですか？

初回COVID-19ワクチンによる予防効果は最終的には薄れてしまいます。ブースター接種により、この予防効果を取り戻すことができます。また、COVID-19は時間の経過とともに変化していくため、当初のワクチンやブースター接種では、新種ウイルスや変種ウイルスに対する予防は比較的期待できません。ブースターは、新しい変異体にも予防効果を発揮できるよう科学者により設計されています。

#### 以前接種したワクチンと最新のブースターではどのような違いがありますか？

プライマリーシリーズとも呼ばれる最初のCOVID-19ワクチンは、当初のCOVID-19に対する予防を目的として設計されています。初回のブースターでは、COVID-19感染に備えるよう体に働きかけることでこの予防機能を取り戻していました。最近開発された（2番目の）ブースターは、最もよく見られるCOVID-19の変種であるBA 4とBA 5（オミクロン株）に対する予防効果の回復と追加を行います。

#### すでにCOVID-19に感染している場合はどうなりますか？

COVID-19に感染していたとしても、COVID-19ブースターを接種することでウイルスに対する予防効果が追加されます。

### どのタイミングでワクチンを接種すれば最新と見なされますか？

最新と見なされるワクチンとブースターは、年齢により決まります。[疾病予防管理センター（CDC）](#)による推奨は次のとおりです。



年齢

6か月～4歳

接種内容

プライマリーシリーズ  
 +  
 2番目のブースター  
 （ファイザー社または  
 モデルナ社製）




年齢

5～11歳

接種内容

プライマリーシリーズ  
 +  
 2番目のブースター  
 （ファイザー社または  
 モデルナ社製）



年齢

12～17歳

接種内容

プライマリーシリーズ  
 +  
 2番目のブースター  
 （ファイザー社または  
 モデルナ社製）



年齢

18歳以上

接種内容

プライマリーシリーズ  
 +  
 2番目のブースター  
 （ファイザー社または  
 モデルナ社製）

接種すべきブースターや接種タイミングについてご不明点がございましたら、CDCの[対話型ブースタークイズ](#)をご利用ください。

**COVID-19ブースターは無料で今すぐ接種いただけます。**

[NCRサポート](#)をご活用の上、ワクチン接種をご予約ください。[ファインダー](#)をご利用いただくか1-877-904-5097までお問い合わせの上、お近くのワクチン接種場をご確認ください。

This publication is supported by the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling \$5,793,548 with 100% percent funded by CDC/HHS. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by CDC/HHS, or the U.S. Government.