

دليل ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ لفايزر لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا

في 29 أكتوبر 2021، حصلت شركتنا فايزر وبيونتيك على ترخيص استخدام لقاح كوفيد-19 الخاص بهما في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا، ووافق مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على استخدامه.

- وعلى الرغم من أن هذه الخطوة مهمة في عملنا نحو الإنصاف في إتاحة اللقاحات، إلا أن نسبة تفوق 25% بقليل من الأهالي فقط قالوا إنهم سيقومون بتلقيح أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا "على الفور". ابتداءً من 15 نوفمبر، كان عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 أكثر من **3,64 مليون**. (المصدر: مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها)
- بعد إجراء اختبارات ومراجعات صارمة، رخصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا وأوصى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها باستخدامه. وبالاستناد إلى النتائج الساحقة للتجارب التي أجريت، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن اللقاح آمن وفعال.
- وحتى اليوم، وبعد إعطاء مئات ملايين الجرعات للبالغين والمراهقين، **لم يظهر لقاح فايزر أي حالات آثار جانبية على المدى الطويل**. ونحن نعرف أنه آمن وفعال لدى البالغين ويمكننا الاطمئنان لأننا نعرف أنه سيكون آمنًا وفعالاً لدى الأطفال أيضًا. (المصدر: مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها)

الأسئلة المتكررة

• كيف يمكنني تلقيح طفلي وأين؟

- سيتوفر اللقاح لدى عدد كبير من عيادات طب الأطفال والعائلة والإدارات الصحية المحلية والمراكز الصحية في المجتمعات والصيدليات والمراكز الصحية في المدارس. وقد يتوفر في بعض المناطق لدى العيادات الصحية الريفية والمراكز الصحية لسكان هاواي الأصليين والمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى بعض المدارس لقاحات متوفرة للعائلات. ونحن نشجع الجميع على التحلي بالصبر فيما يقوم المقدمون بوضع أنظمة للتطرق إلى زيادة الاهتمام بالتلقيح. راجع مقدمك الطبي المعتاد وموقع [Vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) والإدارة الصحية المحلية لديك للاطلاع على المواقع التي تستطيع زيارتها.

• ما الفرق بين اللقاحات التي يتم إعطاؤها للأطفال واللقاحات التي يتم إعطاؤها للبالغين؟

- تساوي جرعة اللقاح الذي يتم إعطاؤه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا ثلث الجرعة التي يتم إعطاؤها للمراهقين والبالغين. وتم اختيار الجرعة للموازنة بين السلامة والفعالية بالنسبة إلى الجهاز المناعي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا. ولا يتم قياس جرعة اللقاح بالوزن، بل بعمر الجهاز المناعي. (المصدر: مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها)

● هل سيؤثر لقاح كوفيد-19 على خصوبة طفلي؟

○ كلا، لا وجود لأي أدلة تشير إلى أن مشاكل الخصوبة هي من الآثار الجانبية لأي لقاح، ويشمل ذلك لقاحات كوفيد-19. وتوصي كل من الكلية الأمريكية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد والجمعية الأمريكية للطب التناسلي (اختصاصيون بالخصوبة) بشدة بأن يأخذ الأشخاص لقاح كوفيد-19. (المصدر: [الكلية الأمريكية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد](#))

● هل يستطيع طفلي أخذ لقاح كوفيد-19 في نفس وقت اللقاحات الأخرى؟

○ نعم! وفقاً لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يمكن إعطاء تطعيمات الطفولة ولقاحات الإنفلونزا الروتينية بشكل آمن في نفس وقت إعطاء لقاح كوفيد-19. (المصدر: [مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها](#))

● ما هي الآثار طويلة الأجل للقاح على الأطفال؟ كيف يمكننا أن نتأكد من سلامة اللقاح؟

○ تمامًا كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى، من المتوقع أن يكون لهذا اللقاح آثار جانبية قصيرة الأجل مثل الألم في الذراع والحمى. لم نلاحظ أي آثار جانبية طويلة الأجل بعد عام كامل تقريبًا من إعطاء اللقاح لمئات ملايين البالغين، ونحن لا نتوقع رؤية أي آثار جانبية طويلة الأجل لدى الأطفال باستثناء حمايتهم من الكوفيد-19. (المصدر: [مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها](#))

● هل تفوق فوائد تلقيح طفلي المخاطر المترتبة عنه؟

○ نعم. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإعطاء لقاح كوفيد-19 لكل الأطفال الذين يبلغون من العمر خمسة أعوام أو أكثر والذين لا يعانون أي حساسية شديدة ضد اللقاحات. وفي حالات التهاب عضلة القلب النادرة جدًا، قامت لجنة مستقلة من الأطباء والعلماء بمراجعة البيانات بدقة واتفق أعضاؤها على أن المخاطر المنسوبة للقاح كوفيد-19 هي أقل بكثير من المخاطر التي قد يتعرض إليها الأطفال إذا أصيبوا بالكوفيد-19. كما اتفقوا على أن خطر الإصابة بكوفيد-19 بشكل عام يفوق أي آثار جانبية محتملة للقاح. (المصدر: [مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها](#))

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS.

قم بزيارة موقع apiahf.org وموقع madetosave.org للاطلاع على مجموعة واسعة من الموارد والمعلومات لتحمي أحبائك من الكوفيد-19.